

TRIBUNA MEDICA

- JUNIO 1969 -

NUMERO EXTRAORDINARIO

ORGANIZADO POR
ANTIBIOTICOS, S.A.

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE

ANTIBIOGRAMAS



En el laboratorio de Antibióticos, S. A., trabajando sobre antibiogramas. Esta técnica está indicada en todas las infecciones que, siendo originadas por gérmenes presuntamente dependientes de un antibiótico, evolucionan a la cronicidad o a las recaídas. (Foto José Luis Sanz.)

El antibiograma está indicado en todas las infecciones agudas graves—meningitis, trombosis de senos venosos, repsis, endocarditis, peritonitis, endometritis, heridas y quemaduras infectadas—, en las que el diagnóstico bacteriológico indique la presencia de gérmenes caracterizados por su sensibilidad lábil y oscilante a los antibióticos.

(“El antibiograma en la clínica”. Dr. E. Chico)

NUEVO MAXICILINA LACTANTES GAMMA

La adición de
gamma globulina:

- Elimina los fenómenos de carencia inmunitaria (tan frecuentes en las infecciones de lactante).
- Neutraliza las toxinas de numerosos gérmenes, potencializando así la acción de la ampicilina.

Dosis de ampicilina
y de gamma globulina
específica para lactantes

PRESENTACIÓN Un envase contiene:
50 mg. de ampicilina sódica
200 mg. de ampicilina benzatina
50 mg. de gamma globulina esterilizada