



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal



L'arpella sobrevolant el Parc Natural del Delta de l'Ebre. FOTO: DAVID BIGAS

Parc Natural del Delta de l'Ebre

L'arpella torna a criar al Delta després de 40 anys

Un equip tècnic va confirmar la nidificació amb èxit de dues parelles d'aquesta espècie rapinyaire al Parc Natural del Delta de l'Ebre

NÚRIA MESSEGUER FERRÉ
REDACCIÓ

L'equip de seguiment de fauna del Parc Natural del Delta de l'Ebre va confirmar la nidificació amb èxit de dues parelles d'arpella comuna (*Circus aeruginosus*), una espècie rapinyaire que no es reproduïa en aquesta àrea des de fa més de quaranta anys. Els primers indicis de la troballa es van detectar a finals d'abril, amb l'observació repetida de vols nupcials a la zona de Vilacoto i l'Encanyissada. Posteriorment, també es van observar mascles aportant preses dins dels canyissars on suposadament es trobaven els nius. La con-

la població europea, i a primers dels anys vuitanta ja només es coneixien 2 parelles nidificants, moment en la població del Delta es va extingir. Les causes més probables estan lligades a la pràctica il·legal, però habitual, d'abatre exemplars durant les càceres, a l'ús d'esquers enverinats i a la ingestió de perdigons de plom. No obstant això, les poblacions mi-

teix, es va mantenir un petit contingent d'ocells immadurs estiuencs que no arribaven a reproduir-se (sempre menys de 5 individus). La població reproductora catalana es va recuperar amb escreix a partir de finals dels anys noranta, especialment a la plana de Lleida, on actualment habiten unes 200 parelles reproductores. Darrerament la principal amenaça pel potencial contingent reproductor rau en les transformacions agrícoles que afecten les àrees de caça al voltant de les zones on nidifica, i en una possible interferència negativa amb la gran població hivernal, que impediria l'assentament de potencials nous

El Delta
La principal zona humida de Catalunya

● El Parc Natural del Delta de

