

**MEDI AMBIENT** Mortalitat del 100% allà on s'ha fet la inundació

## L'aigua de mar als camps del Delta redueix a un terç el nombre de caragols maçana

DELTEBRE ACN

La inundació amb aigua del mar dels arrossars més pròxims a la costa del delta de l'Ebre ha aconseguit eliminar en un període mínim de tretze dies la totalitat dels caragols maçana dels camps on s'ha experimentat. Amb aquesta idea, el departament d'Agricultura ja ha començat a aplicar el mateix procediment als desaigües de l'hemidelta esquerre i, així, intentar frenar al màxim la plaga que afecta el conreu de l'arròs abans que comence la sembra aquesta primavera. De moment, tot i que el caragol maçana ha ampliat la seua presència fins a les 847 hectàrees, respecte a les 578 registrades el 2010, la seua població s'ha reduït en un 64%.

L'experiment d'inundar amb aigua salada unes 200 hectàrees de camps d'arròs n'ha permès confirmar l'eficiència en les condicions adequades, segons ha explicat el responsable d'Agricultura en la lluita contra la plaga del caragol maçana, Hernán Subirats.

### DESTACAT

L'assecamment dels camps concentra les aus a l'hemidelta dret

■ El nombre d'aus que hivernen al delta de l'Ebre no s'hauria vist afectat enguany per la mesura d'assecamment els arrossars de l'hemidelta esquerre en el marc de la lluita contra la plaga del caragol maçana. La mesura, però, ha obligat els ocells més dependents dels arrossars a concentrar-se a l'hemidelta dret, on no s'ha aplicat. Aquesta és una de les principals conclusions del cens hivernal d'ocells aquàtics al parc natural del Delta de l'Ebre, que ha comptabilitzat en total 267.635 aus –xifra lleugerament superior a la mitjana dels últims deu anys. L'operació s'ha efectuat entre els passats dies 7 i 24 de gener amb la participació de 34 persones, entre tècnics del parc, agents rurals i voluntaris. De les espècies més habituals, el grup més nombrós és el dels anàtids –un 38,8%–, entre els quals destaquen l'ànec coll verd (68.654), el xarxet (25.548) i l'ànec cullerot (13.731). També s'ha observat forta hivernada d'ànec blanc que, amb 1.855 exemplars, assoleix el segon rècord de tota la sèrie històrica.

**"En més de tretze dies submergit amb aigua salada, no en queda ni un. Té una eficiència del 100%",** ha assegurat, destacant-ne el reduït cost respecte a altres tractaments i els beneficis sobre l'agricultura per eliminar també espècies vegetals no desitjades dels camps –tot i que obliga a rentar-

los amb aigua dolça posteriorment.

L'efectivitat, però, decreix en la mesura que reste una làmina d'aigua dolça als camps o es mantinga la procedent del mar durant menys temps. Així, Subirats ha indicat que amb una làmina de "dos dits" d'aigua dolça, aquesta mortalitat no arriba al 5%. ■