




Imatge de la visita que més d'un centenar d'arrossaires va fer per les instal·lacions de l'IRTA ubicades a Amposta. FOTO: JOAN REVILLAS

L'APUNT

La temporada de sega

Els primers camps d'arròs de la varietat bomba començaran la sega a principis de setembre, concretament d'aquí a deu dies, i a partir del 15 de setembre s'iniciarà l'activitat a la resta de camps i varietats.

Durant aquesta temporada, i segons el representant del sector de l'arròs al sindicat Unió de Pagesos, Dani Forcadell, «esperem assolir una producció total que oscil·li entre els 110 i els 115 milions de quilos d'arròs». Aquesta previsió optimitiva està determinada per la meteorologia favorable que ha precedit el conreu.

Segons Dani Forcadell, «durant la primavera i el mes de juliol passat hem tingut un temps immillorable per a tota la producció». Si es fes realitat el pronòstic del responsable del sector de l'arròs de UP, la sega d'arròs recuperaria els valors de la campanya de l'any 2009.

MEDI AMBIENT ■ RESPONSABLES DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL VAN EXPLICAR LES MESURES D'ERADICACIÓ

La plaga del caragol poma s'estén a 574 hectàrees d'arrossars del Delta

La presència de l'espècie al marge esquerre és la principal preocupació dels agricultors, que ahir van participar en una jornada sobre la sanitat vegetal als camps d'arròs

PER SILVIA FORNÓS

La plaga del caragol poma al marge esquerre del delta de l'Ebre continua expandint-se. Les darreres xifres, que es van donar a conèixer ahir durant una jornada del camp de l'arròs a les instal·lacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, apunten que hi ha afectades 574 hectàrees d'arrossars en diferents nivells d'intensitat.

El control de la plaga és ara per ara la principal preocupació dels agricultors: «Aquest cens que s'ha realitzat a finals de 2010 i principis de 2011 és prou fiable i no és alarmant, però és necessari que els pagesos en continuïn denunciant l'existència a qual-sevol de les 9.500 hectàrees cultivades d'arròs», afirma el representant del sector de l'arròs al

sindicat Unió de Pagesos, Dani Forcadell.

Per tal de donar a conèixer l'efectivitat de les mesures d'eradicació, dos responsables de la Unitat del Servei de Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre van explicar-les als més de 150 arrossaires assistents, i procedents d'Andalusia, el País Valencià i el sud de França.

«Les mesures es desenvolupen de manera transversal al riu Ebre, a la xarxa de drenatge i als mateixos camps d'arròs afectats, ja que aquesta és la millor manera de combatre la dispersió de la plaga», explica Gemma Galimany, responsable del Servei de Sanitat Vegetal.

Però la Generalitat insisteix que «són els agricultors els qui han d'alertar de l'existència de l'espècie invasora per actuar ràpi-



La plaga d'aquesta espècie invasora es troba al delta de l'Ebre des de l'any 2009. FOTO: JOAN REVILLAS

dament contra la plaga i amb la màxima eficàcia possible».

La salinitat

El problema de la salinitat al sòl va ser una altra de les qüestions que es va tractar durant aquesta jornada del camp de l'arròs. En aquest sentit, tècniques de l'IRTA van anunciar els assaigs que s'estan fent amb diverses varietats d'arròs per saber quines to-

leren més la salinitat, a través d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Segons Maria del Mar Català, tècnica de l'IRTA, «varietats com la *bahia* han demostrat la seva tolerància a la salinitat i l'objectiu és obtenir varietats que es puguin consumir en cas que en un futur es restringeixi l'entrada d'aigua en els arrossars del Delta».

LES XIFRES

2-3

mesos

■ És el període en què els exemplars juvenils arriben a la maduresa, fet que augmenta la seva capacitat de ser una plaga.

60-90%

Els danys

■ Segons el nivell d'individus del caragol poma els danys en els arrossars poden arribar a oscil·lar aquests elevats percentatges.

100

unitats esdevenen un nivell alt d'afectació

■ El grau d'afectació dels arrossars i el nivell d'intensitat depèn del nombre d'unitats d'aquesta espècie invasora. Així, les parcel·les que d'entre 10 i 100 unitats tenen un grau d'afectació mitjà, i les que compten amb menys d'una desena de caragol poma la intensitat és baixa.