

ROQUETES ■ LA MALALTIA FOU DETECTADA EL 2004

Repunta el brot de tuberculosi en els senglars del barranc de Lloret

El brot de tuberculosi que afecta els porcs senglars del barranc de Lloret, a la Reserva Nacional de Caça dels Ports, ha repuntat l'any 2011 malgrat la campanya insistent realitzada els últims anys per eradicar la malaltia, detectada l'any 2004. Aquest cap de setmana s'han realitzat dues caceres programades més per avaluar la incidència del brot.

PER A. CARALT

Els senglars malalts de tuberculosi s'han doblat en l'última temporada de caça (2011-2012) al barranc de Lloret, segons dades oficials aportades per l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas. Si en la campanya 2010-2011 es van caçar 33 exemplars adults amb 9 de

positius detectats (27%), a la campanya actual se n'han caçat fins ara 38 d'adults en dues caceres diferents amb 17 de positius (44,7%).

Aquest cap de setmana, dissabte i ahir diumenge, els caçadors de Mas de Barberans i Roquetes han realitzat dues caceres extraordinàries més, una de les mesures emprades per a controlar la malaltia. Amb les dues caceres s'actualitzaran les dades i s'avaluarà l'evolució del rebrot.

En tot cas, es tracta de dades preocupants en relació amb anys anteriors, quan es van detectar xifres del 23% de positius el 2009-2010 i del 30% el 2008-2009. Els dos anys anteriors, en canvi, els positius s'havien elevat per sobre del 60 i el 70%.



Imatge d'arxiu d'un exemplar de porc senglar, en un camp de Bitem. FOTO: JOAN REVILLAS

44,7% casos positius

La xifra de la
temporada actual
duplica l'any anterior

El brot va aparèixer el 2004 i fou el primer d'aquestes característiques a la fauna salvatge de Catalunya. La malaltia va afectar un ramat de bous braus que pasturava a la zona i va passar als senglars perquè es devien haver alimentat d'alguns bous morts i abandonats.

El 2009 es van sacrificar tots els animals de l'explotació ramadera mentre s'intensificà la cacera de senglars per controlar-ne el

brot. Posteriorment, s'hi han traslladat nous exemplars, tots ells amb un control sanitari previ.

La necessitat d'actuar radica en la possibilitat que la malaltia pugui afectar els humans, tot i que les analítiques realitzades als caçadors sempre han donat negatiu. També està garantit que la carn dels senglars malalts no es destina al consum humà. La malaltia està focalitzada al barranc de Lloret.