

MEDI AMBIENT ■ EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA HA ACTIVAT UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER DONAR-LA A CONÈIXER

Alerta a la Ribera d'Ebre per una mosca asiàtica que ataca els cirerers

Agricultura certificà el 2011 danys greus al Baix Llobregat i la seva presència a l'Ebre. El sector està convocat demà a una jornada per rebre tota la informació sobre la nova plaga

PER **A. CARALT**

Una nova plaga amenaça el sector primari de les Terres de l'Ebre. La mosca d'origen japonès *Drosophila suzukii*, coneguda com a mosca suzukii, ha posat en alerta el sector d'arbres fruiters de la Ribera d'Ebre després que la seva presència en la campanya anterior ja fou evident i provocà els primers danys no quantificats. En cultius de cirerers a la comarca del Baix Llobregat i de maduixes al Maresme, en canvi, es van certificar danys molt destacats.

El Departament d'Agricultura i el sindicat Unió de Pagesos han convocat per demà, dimarts, els fructicultors de la Ribera d'Ebre a una jornada tècnica per conèixer el comportament de la nova plaga i difondre els mètodes de control existents davant la ràpida difusió de l'insecte arreu de Catalunya.

La mosca suzukii és originària del sud-est asiàtic i està àmpliament estesa per la Xina, l'Índia, Corea, Myanmar, Rússia i Tailàndia. Als Estats Units es va localitzar l'any 2008 i està provocant «danys de consideració», segons el Departament d'Agricultura. A més de la cirera i la maduixa, tam-

bé s'han certificat danys en pruna, préssecs, albercocs i raïm. També és capaç de viure sobre fruits silvestres. L'any 2010 el Departament la va detectar a 15 municipis catalans i el 2011 en 36 municipis, alguns d'ells de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i l'Alt Camp.

Xarxa de trampes

En aquest 2012, els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat ha escampat una xarxa de trampes pel territori per controlar l'expansió de l'insecte mentre s'avaluen els tractaments fitosanitaris més adequats per fer-hi front.

Un dels socis de la principal empresa productora de cireres a l'Ebre, David Manero, de Cerima Cherries, ha admès al *Diari* la seva preocupació davant la presència d'aquesta espècie. «Ens preocupa força, ja que és una plaga nova i no sabem si serà significativa o no. Ara bé, tampoc cal crear alarma perquè potser el seu efecte és menor».

Agricultura ha recomanat com a mesura preventiva de control la retirada dels fruits sobremadurats dels arbres i les plantes i dels fruits caiguts a terra.



■ Danys greus de la mosca '*Drosophila suzukii*' sobre les cireres. FOTO: DEPARTAMENT D'AGRICULTURA

L'APUNT

Les larves s'alimenten des de l'interior del fruit

El Departament d'Agricultura ha editat diversos documents sobre la nova plaga que amenaça els arbres fruiters. El dany es produeix quan la femella adulta fa un orifici de la mida d'una agulla de cosir per ovopositar. Així, quan les larves emergeixen de l'ou comencen a alimen-

tar-se de la polpa del fruit. Dies després, la part del voltant del fruit on la larva s'alimenta es col·lapsa. D'aquesta manera, augmenta la probabilitat a ser infectada per fongs o bacteris que acceleren la descomposició del fruit.

La mosca adulta viu de tres a nou setmanes,

durant les quals cada femella pot pondre 300 ous. Les temperatures benignes propicien la seva màxima activitat, que disminueix amb força per sobre de 30 graus centígrads.

L'insecte presenta una aparença molt similar a l'anomenada mosca del vi-

nagre *Drosophila melanogaster*. Els seus trets més característics són les dues taques negres a les ales en el cas dels mascles.

En cas de detectar la seva presència, la Generalitat recomana avisar Sanitat Vegetal per verificar el diagnòstic i adoptar mesures de control.