

MEDI AMBIENT Esta espècie invasora mata l'arbrust a poc a poc sobretot a partir del tercer o quart any de defoliació constant

La papallona defoliadora del boix s'expandix als Ports, on se n'han capturat una vintena d'exemplars

Roquetes ACN

La presència de papallona defoliadora del boix comença a créixer al Parc Natural dels Ports i a la forest de les Terres de l'Ebre. És una espècie invasora detectada a Europa el 2008 i a Catalunya el 2014. Va aparèixer al Baix Ebre i al Montsià a la primavera de l'any passat i ja se'n van trobar exemplars als Ports, a la tardor. Amb l'experiència de la Garrotxa, on ja es compten a milers, les previsions no

són bones perquè no hi ha tractaments per a frenar-ne l'expansió més enllà d'esperar que els arbustos creïn mecanismes de control naturals a través d'algun paràsit i les masses de boix s'acaben adaptant a l'eruga. Això seria més a llarg termini. També poden haver-hi espècies de fauna autòctona, com la cucut reial, que s'alimenten de l'eruga i propicien un reequilibri, **"però haurem de veure si serà suficient per a controlar la plaga i quins efectes haurà tingut sobre els**

boixos", obre interrogant el cap dels Agents Rurals, Miquel Àngel Garcia.

El Parc Natural ha ubicat a la zona de Cova Avellanés una estació de control i seguiment, on es penjen trampes de feromones sexuals als arbres pròxims als boixos on queden atrapats els exemplars de papallona del boix (*Cydalis Perspectalis*). Els últims mesos se n'han capturat uns 20 exemplars, de juliol a setembre. Enguany els danys en algunes de les boxedes ja són evidents, com ha ex-



plicat el tècnic de Parc Natural dels Ports, Joan Mestre. **"La previsió és que en un futur vaja a més"**, preveu.

Esta espècie invasora mata l'arbrust a poc a poc. L'eruga s'alimenta de les fulles i quan les acaba, rosega l'escorça. Mestre ha apuntat que el boix té certa capacitat de rebrotar però si la defoliació és constant durant diversos anys -sobretot a partir del tercer o el quart-, l'insecte acaba matant la planta. Es desconeix si el clima mediterrani o altres condicions propicien que la plaga s'estengi. **"Només sabem que necessita boix i al Parc Natural n'hi ha molt"**, ha apuntat el tècnic dels Ports. És el matoll dominant al sotabosc de la zona central del massís. ■