



Un grup d'aus en un arrossar el febrer de l'any passat. FOTO: JOAN REVILLAS

Medi ambient

Nou descens de les aus que passen l'hivern al Delta

El recompte anual del Parc Natural registra enguany poc més de 176.000 ocells aquàtics hivernals, la xifra més baixa dels últims anys

REDACCIÓ
DELTEBRE

El parc natural del delta de l'Ebre ha registrat enguany poc més de 176.000 aus aquàtiques hivernals, la xifra més baixa dels últims anys. La inundació de només el 31,4% dels arrossars durant l'hivern té efectes molt negatius sobre les espècies que més depenen d'aquest hàbitat, com la daurada grossa, la fredeluga i bona part dels ardeids. Altres espècies menys dependents com el flamenc, l'ànec blanc, el territ variat o el bec d'alena, han mantingut o superat les poblacions habituals.

L'últim cens ha estat un 28% inferior comparat amb les poblacions d'aus aquàtiques hivernals dels anys de màxima inundació dels arrossars, entre 2005 i 2010.

Enguany, com és habitual, el grup més nombros ha tornat a ser el dels anàtids (66.930 exemplars, que representa el 38% del total). Sobretot s'ha detectat l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) amb 33.132 exemplars, l'ànec culerot (*Spatula clypeata*) amb 12.725 exemplars i el xarret comú (*A. crecca*) amb 11.143. Globalment, aquest grup ha mostrat un valor molt inferior (-44%) en comparació amb la mitjana del període de referència (2005 - 2010), moment en el qual la

inundació hivernal dels arrossars era màxima.

El recompte hivernal d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre s'integra dins del global que la Generalitat coordina per a tot el territori català i que, a banda del delta de l'Ebre inclou dades de prop 200 localitats a gairebé totes les comarques catalanes. Aquestes da-

L'apunt
Cens elaborat tot i la pandèmia de Covid-19 i el temporal Filomena

El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha enllestit l'últim cens hivernal d'aus aquàtiques, elaborat el passat mes de gener amb el suport del Cos d'Agents Rurals, i amb la participació de 23 persones en total. A diferència d'altres anys, la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a limitar la participació de persones voluntàries. Una altra particularitat és que el pas del temporal Filomena, del 6 al 11 de gener, no ha acabat afectant de manera significativa els resultats, atès que el cens es va dur a terme durant pràcticament tot el mes, del 4 al 21 de gener.

des es coordinen amb la resta de les de l'Estat i formen part de l'International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen en més 80 països d'Europa, Àsia i nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i, també a escala local, avaluar la capacitat d'acollida d'aquest espai natural, que constitueix la principal zona humida de Catalunya i de les més importants del sud d'Europa.

L'asseccament dels arrossars durant l'hivern constitueix una mesura de lluita contra el cargol poma implantada al 2011. Enguany, la superfície inundada d'arrossars ha assolit solament el 31,4% i ha fluctuat entre el 15,5 i el 47,5% en el període 2016-2020.

Les dades obtingudes a partir dels censos hivernals d'ocells aquàtics suposen un bon indicador sobre la pèrdua de la capacitat d'acollida que ha patit el Delta, com a zona humida, en aquests darrers anys i per extensió del seu impacte sobre l'avifauna hivernal catalana en tant que principal zona d'acollida d'aquestes espècies al país. Així, els valors actuals s'allunyen força dels màxims històrics (amb més de 300.000 ocells) que s'assolien quan s'inundava la pràctica totalitat de la superfície d'arrossars.