



Tècnics del Parc Natural observant aus ahir des del mirador de l'Encanyissada. FOTO: JOAN REVILLAS

Medi Ambient

Màxim històric d'ocells aquàtics hivernals al Delta

Amb tot, el Parc Natural segueix demanant que es mantinguin inundats els arrossars per garantir la capacitat d'acollida

REDACCIÓ / ACN
DELTA DE L'EBRE

El parc natural del delta de l'Ebre ha comptabilitzat enguany més ocells hivernants que mai, però segueix demanant que es mantinguin inundats els arrossars per garantir la capacitat d'acollida.

El cens efectuat durant les últimes setmanes ha sumat més de 317.425 ocells i els flamencs també han assolit una xifra històrica, amb 6.470 exemplars. Unes dades, segons el tècnic del parc natural, Toni Curcó, que s'expliquen pel fet que la superfície de camps inundada ha pujat fins al 60%, pel fred al centre i al nord d'Europa així com per la sequera en altres zones humides. Malgrat la tendència global positiva, el cens detecta diferències entre grups d'ocells: els que depenen més de la inundació dels arrossars noten de forma negativa l'assecament.

El grup més nombrós ha estat el dels anàtids (181.333 exemplars, 57,1% dels efectius), representat sobretot per l'ànec collverd *Anas platyrhynchos* (105.157 exemplars), i l'ànec cullerot *Spatula clypeata* i el xarxet comú *A. crecca*, ambdós amb valors força similars (29.889 i 29.740 exemplars, respectivament). Globalment, aquest grup ha mostrat un valor molt superior (+51%) en comparació amb la mitjana del

període de referència (2005 – 2010), moment en el que la inundació hivernal dels arrossars era màxima. Bona part de les espècies (ànec cullerot, xarxet comú, ànec griset) han mostrat increments força notables, superiors al 20%, i destaca el valor excepcionalment alt de l'ànec collverd (+84%).

Altres espècies, en canvi, han presentat poblacions hivernals molt per sota: morell de cap roig (-69%), xibec *Netta rufina* (-38%) i ànec cuallarg *A. acuta* (-25%). La fotja vulgar, per la se-

El cens suma més de 317.425 ocells i els flamencs també han assolit una xifra rècord

va banda, amb 18.621 exemplars, ha presentat un valor força baix (-34%), molt allunyat de les 30.000 – 40.000 fotges que es van recomptar entre 2010 i 2017.

El comptatge hivernal d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre s'integra dins de l'International Waterbird Census (IWC), que quantifica anualment el nombre d'ocells aquàtics (anàtids, limícoles, ardeïds, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i nord d'Àfrica. Les dades obtingu-

des permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i, a escala local, avaluar la capacitat d'acollida de cada zona humida. Al delta de l'Ebre, aquest cens s'ha portat a terme enguany gràcies a la participació de 27 observadors, sobretot tècnics del parc natural i agents del Cos d'Agents Rurals.

«Per nosaltres és important que la superfície d'espais inundats es mantingui el màxim possible perquè això determina la capacitat d'acollida de moltes espècies», ha subratllat Curcó. Des del parc consideren que davant la necessitat de garantir els compromisos de conservació amb la Unió Europea i mantenir la capacitat d'acollida de la zona, tendent a disminuir a llarg termini, consideren que es tracta d'una mesura important. Especialment, per a aquelles espècies que no poden trobar hàbitats alternatius.

Un procés de convivència de mesures per potenciar la biodiversitat faunística del Delta i les necessitats agronòmiques –focalitzades en la lluita contra el caragol poma-, que Curcó, assu-meix, «no serà fàcil». Amb tot creu que resulta tècnicament «possible» fer-ho compatible en gran mesura i partint del coneixement sobre els efectes que mesures com la inundació poden tenir sobre espècies concretes que aporten aquests estudis.