

L'alt cabal de l'Ebre retarda 4 mesos el tractament contra la mosca negra

La històrica crescuda del riu a l'hivern i els continus repunts durant la primavera impedeixen l'inici de la lluita contra l'insecte

A. CARALT

Un episodi d'augment inesperat del cabal del riu Ebre, aquest cop provocat en bona part per la crescuda del riu Segre, posa en entredit la data prevista del primer tractament contra la plaga de la mosca negra.

En els últims dies, l'Ebre havia disminuït progressivament fins assolir els 400 m³/segon, una xifra molt propera al cabal òptim per abocar al riu l'insecticida biològic BTI, que se situa entre 200 i 300 m³/s. Amb aquesta perspectiva, els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE) havien previst el primer tractament de l'any a finals de maig. Tanmateix, el riu al seu pas per Ascó fregava ahir a la tarda els 700 m³/s, volum que impossibilita cap tractament i posa en dubte la data escollida pels tècnics.

Així, s'acumularan un mínim de quatre mesos de retard en l'inici dels tractaments contra la mosca negra respecte a l'any passat, una campanya considerada exemplar. Enguany, la situació és inèdita. La històrica crescuda de l'Ebre durant els mesos d'hivern i els



Imatge de la preparació d'un tractament contra l'insecte. FOTO: J. REVILLAS

L'APUNT

Creixen les visites per picades al Baix Ebre el 2012

■ La mosca negra és un insecte volador de l'ordre dels dípters i la família dels simúlids. El seu radi d'acció pot arribar als 50 quilòmetres. Són molt agressius i produeixen picades molt doloroses. La seva picada és caracteritzada per un punt central vermell i una inflamació destacable, normalment sagnant. En persones sensibles pot produir un edema. En cas de picada, cal rentar i desinfectar la zona afectada i si les molèsties persisteixin consultar un metge.

L'any 2012, la Regió Sanitària de l'Ebre va atendre 3.756 casos de picada de mosca negra, una xifra similar a l'obtinguda l'any 2011.

Ala comarca del Baix Ebre, les visites van augmentar un 6 per cent i van disminuir un 5 per cent a la Ribera d'Ebre.

cent de macròfits, plantes aquàtiques sobre les quals es desenvolupa l'insecte. L'impacte global de la plaga durant l'any, doncs, s'estima menor que en anteriors campanyes. Ara bé, ara fa dues setmanes, els tècnics van realitzar un primer mostreig i, malgrat els efectes beneficiosos de la crescuda, van detectar larves, sobre tot a l'àrea d'Amposta.

El període creixement de les larves fins a convertir-se en mosca adulta oscil·la entre les 3 i 4 setmanes. Durant l'any poden néixer fins a set generacions de mosca negra tot i que la màxima eclosió de la plaga es produeix a la segona meitat de juliol. Així doncs, els tractaments previstos al maig i juny són vitals per mantenir sota control l'espècie.

Escosa assegura, en aquesta línia, que els macròfits tornaran a créixer en algunes zones de l'Ebre català impulsades per les altes temperatures, fet que facilitarà el desenvolupament de l'insecte. «Estem preparats i a punt, però hem d'esperar que disminueixi el cabal del riu», sentència el director.

Set tractaments el 2012

El CODE aplicà l'any passat un total de set tractaments, entre gener i octubre, en set trams del riu des d'Ascó a Amposta. L'insecticida s'aboca al riu mitjançant un helicòpter. Enguany es destina un pressupost de 642.156 euros a la lluita contra la plaga a les Terres de l'Ebre i a la part baixa del Segre i Cinca.

LES XIFRES

640M

euros

■ Pressupost de 2013 contra la plaga a l'Ebre i part baixa del riu Segre i Cinca

3.756

assistències

■ Nombre de visites a la Regió Sanitària de l'Ebre el 2012 per picades de mosca negra

684

m³/segon

■ Cabal del riu Ebre, ahir a la tarda, al seu pas per l'estació d'aforament d'Ascó

repunts constants durant la primavera han impedit atacar les larves de l'espècie, objectiu del tractament.

El director tècnic del CODE, Raül Escosa, es mostra prudent i a l'expectativa en declaracions al *Diari*. D'una banda, subratlla que la crescuda d'hivern ha permès eliminar entre el 70 i el 80 per