

certa presència d'avortaments en edats més avançades: se van registrar 34 IVE en dones de 40 a 44 anys i 3 en majors de 44. En el segment més jove, se comptabilitzen 48 casos entre dones de 15 a 19 anys i fins i tot un cas en una menor de 15 anys, localitzat al Baix Ebre.

Per comarques, destaca que al Montsià el grup amb més avortaments és el de 30 a 34 anys (35 casos), mentre que al Baix Ebre sobresurt la franja de 20 a 24 anys (31 casos).

Set de cada deu casos se van resoldre amb mètodes farmacològics

Un 34 % de les dones que van avortar l'any 2023 havien nascut a l'estranger

Des de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, les dones poden sol·licitar l'IVE dins d'uns terminis i supòsits clars. La normativa permet interrompre l'embaràs a petició de la dona durant les primeres catorze setmanes de gestació. Entre les setmanes 15 i 22, l'avortament és possible quan existix un risc greu per a la vida o la salut de la mare o si es detecten anomalies greus en el fetus. Més enllà de la setmana 22, només es permet en casos d'anomalies fetals incompatibles amb la vida o de malalties greus i incurables diagnosticades en el fetus.

CRITERIS D'ATENCIÓ El nou Protocol per a l'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs, publicat l'octubre de 2022, ha actualitzat els criteris d'atenció a Catalunya per a millorar l'acompanyament durant el procés. Segons este document, l'IVE farmacològic es pot dur a terme en règim ambulatori en centres autoritzats fins a les 9 setmanes i 6 dies de gestació, i en entorn hospitalari entre les 10 i 14 setmanes. Pel que fa al mètode quirúrgic o instrumental, este s'ha de realitzar sempre en hospitals autoritzats.

El protocol també reconeix el dret de les dones a escollir el centre dins la xarxa autoritzada pel Departament de Salut, tenint en compte la proximitat territorial. ■