

Ebre



Desembassament des de Riba-roja. FOTO: JOAN REVILLAS

Riu Ebre

La crescuda ha mobilitzat fins a 15.000 tones de sediments

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estudia l'arrossegament de materials

DIARI DE TARRAGONA / ACN
SANT JAUME D'ENVEJA

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) calcula que l'avinguda controlada durant 24 hores dels embassaments del tram final del riu podria haver arribat a mobilitzar entre 10.000 i 15.000 tones de sediments. Tot i que els valors de terbolesa, al voltant dels 100 unitats, no han estat tan elevats com a la crescuda natural del mes de febrer, el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme, Miguel Àngel García Vera, destacà que s'han mantingut alts durant tot l'episodi.

Tècnics de la CHE i d'altres organismes van monitoritzar ahir els efectes de l'episodi. També, per primer cop, intentant prendre mostres de sediments més gruixuts, com sorres i graves, que s'arrosseguen pel fons.

Si bé es tracta de càlculs «molt preliminars», segons remarcà el mateix García Vera, les primeres conclusions permeten apuntar que l'episodi ha registrat aportacions «força acceptables» en comparació als anteriors (en alguns casos han pogut arribar a les 20.000 tones). Així ho feia preveure, d'entrada, el fet que la crescuda de febrer, amb diverses

puntes elevades, rentés els sediments de la llera.

Un dels aspectes que han pogut detectar és que els valors de terbolesa elevats s'hagin detectat de forma més o menys sostinguda al llarg de l'episodi, formant un altiplà en la forma de la gràfica. També apunten l'elevat grau d'aquest mateix paràmetre detectat a l'interior del mateix embassament de Riba-roja d'Ebre. «La baixada del nivell ha pogut condicionar una mobilitat més gran de

Tècnics de la CHE i universitats van monitorar els efectes de l'episodi

sediments que en anteriors ocasions», ha precisat.

Ara, els tècnics estudien si aquests sediments han superat la presa del pantà, des d'on es van alliberar un cabal de 1.450 metres cúbics per segon entre dimarts poc abans de les dotze del migdia i dimecres al migdia, quan va començar a descendir progressivament. És el primer cop que aquesta operació s'allarga durant 24 hores, destacà el responsable de la CHE.

L'equip encapçalat per la CHE i amb la participació de personal de l'empresa pública CEDEX, així com les universitats de Lleida, UPC, Politècnica de Madrid i València va tonar per segon any consecutiu per monitoritzar l'episodi. També van prendre mostres dels riu crescut, dels diferents punts del curs baix del riu i fins al Delta. Des de l'embassament, fins a Delta, l'avinguda pot trigar fins a setze hores a arribar.

Una de les novetats que s'ha incorporat enguany també als estudis posteriors és l'assaig «experimental» per intentar quantificar el trànsit de sediments més grans, com arenes i graves, que són arrossegats pel llit fluvial durant les avingudes juntament amb els llims en suspensió. Amb l'ajut d'un torpede metàl·lic de 70 quilos amb una bossa dirigit per un camió grua, els tècnics van intentar atrapar mostres, a diverses distàncies de la llera i profunditats, en punts com l'embarcador de Sant Jaume d'Enveja. «La quantitat que hem recollit no és molt alta. Traiem pocs grams cada vegada que l'introduïm. Això vol dir que el transport de fons no és massa important. Però ho estem caracteritzant i ho analtitzarem», afirmà García Vera.