

Tarragona

Las garrapatas se alimentan de sangre y su picadura puede ser transmisora de enfermedades graves. FOTO: GETTY IMAGES

Medioambiente

Plaga de garrapatas en 26 municipios

Una nueva especie, más agresiva, detectada por primera vez en comarcas de Tarragona. Puede transmitir enfermedades graves como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

CARLA POMEROL DALMAU
TARRAGONA

La garrapata *Hyalomma lusitanicum* ha llegado a tierras tarraconenses. Ha pasado de ser una especie casi residual, residente en entornos rurales y boscosos, a desplegarse en parques y jardines de la ciudad, como explica el Boletín de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN). En los últimos años, la presencia de este ácaro ha aumentado de manera notable en Catalunya, alerta este organismo. Según los datos de la Institució, en 2022, esta especie se encontraba en 31 municipios del Barcelonès, mientras que en diciembre de 2024, ya estaba en 81. De ellos 26 en las comarcas de Tarragona y 55 en las de Barcelona.

Hasta hace poco, esta variedad de garrapata era casi desconocida en Catalunya. El pará-

sito, que se alimenta de sangre de mamíferos, preocupa bastante a las autoridades sanitarias. Su picadura puede ser transmisora de enfermedades graves, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme o la encefalitis. Los 28

En 2022, esta especie se encontraba en 31 municipios catalanes. En 2024, en 81

municipios tarraconenses afectados por la plaga de garrapatas son Albinyana, Alcanar, Altafulla, Amposta, l'Arboç, Banyeres del Penedès, La Bisbal del Penedès, Calafell, El Catllar, Constantí, Creixell, Cunit, Llorenç del Penedès, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, La Riera de

Gaià, Roda de Berà, Sant Jaume dels Domenys, Santa Bàrbara, Santa Oliva, Tarragona, Torredembarra, Ulldecona y El Vendrell.

Andreu García, vicepresidente y portavoz de la Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (Adepap), explica que «no queda claro si esta especie no había llegado a nuestro territorio o es que no se había detectado».

La *Hyalomma lusitanicum* tiene un comportamiento diferente a la mayoría de garrapatas. Las variedades conocidas, como la *Hyalomma aegypti*, se colocan en la parte superior de la hierba, a la espera de que pase algún animal para clavarse en él y nutrirse con su sangre.

Esta nueva especie, en cambio, se oculta bajo la hierba y, al detectar el aliento de una posible víctima, la persigue de forma activa hasta parasitarla. Tam-

bién lo hace con los humanos, de manera infrecuente.

La nueva garrapata no solo se encuentra en entornos boscosos y rurales. Ahora también están en arenas, en parterres, jardines o parques de pueblos y ciudades.

Conejos y jabalíes

«La diferencia en el comportamiento es importante. Sobre todo respecto al método para eliminarlas, pues al encontrarse debajo de la hierba, están más protegidas y el tratamiento es menos efectivo», añade Andreu García.

Una de las causas que explica el incremento de las garrapatas tiene que ver con las altas temperaturas que se registran las últimas semanas —teniendo en cuenta que es enero— y, sobre todo, por la proliferación de animales que son anfitriones y diseminadores de estos ácaros.