

MEDI AMBIENT

Els ornitòlegs observen des del delta de l'Ebre un descens d'ocells migradors de llarga distància

Terres de l'Ebre ACN

Milions d'ocells migradors poden arribar a sobrevolar el cel de Catalunya durant la tardor. Uns retornen al continent africà després de reproduir-se i passar aquí l'estiu. D'altres arriben del nord d'Europa buscant un clima més suau i aliment per a superar l'hivern. Des de l'Estació Biològica de Canal Vell, al delta de l'Ebre, se monitoren els seus moviments des de 1996. Les dades obtingudes ajuden els ornitòlegs a estudiar l'estat i l'evolució de les poblacions per a proposar mesures de conservació. Ara, constaten una caiguda del nombre d'espècies que fan llargues distàn-

cies, com els mosqueters de passa. El canvi climàtic i la reducció d'hàbitats en serien les causes. Este passat 12 d'octubre se va celebrar el dia mundial de les aus migratòries.

Una estesa de xarxes japoneses, ja prohibides per a l'activitat cinegètica però autoritzades excepcionalment per a estes tasques, servixen a ornitòlegs com Àlex Fonollosa per a capturar ocells que sobrevolen l'entorn pròxim del Canal Vell i la bassa de l'Estella. Revisen i recullen els ocells que hi queden atrapats cada quinze minuts al llarg de les sis hores durant les quals les xarxes se mantenen operatives, entre la sortida de sol i migdia.



Fonollosa i altres ornitòlegs treballen per a l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), que s'encarrega d'efectuar este monitoratge en el marc del projecte "Migració", vinculat a l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Les boscarles de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*) segueixen encapçalant la llista de les espècies més atrapades pels ornitòlegs

L'observació i anellament ha permès constatar que espècies com el mosqueter de passa (*Phylloscopus trochilus*) mantenen una tendència descendent els últims anys. El pit-roig (*Erithacus rubecula*) se troba en una situació similar. És un fenomen que han detectat en espècies que migren a llarga distància, com esta, que passa l'hivern al sud del Sàhara. Hi influïxen factors com el clima, la sequera, les males condicions en alguns hàbitats o la disminució d'espais per a la reproducció. ■