

MEDI AMBIENT L'anellament científic forma part del projecte internacional Greater Flamingo Network que estudia els moviments d'esta espècie



A la fotografia superior, els flamencs sortint del corral a les Salines de la Trinitat, i a les inferiors, tres moments del procés d'anellament de les cries de flamenc. / A. HOSTALOT-J.GIL

Èxit reproductor de flamencs al Delta

Tècnics del Parc i més de 200 voluntaris anellen uns 400 polls dels prop de dos milers que han nascut esta primavera a la Punta de la Banya

La Ràpita Joan Josep Carot

Tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre i prop de 200 voluntaris han anellat un any més, i ja en van catorze, al voltant de 400 polls de flamenc de la colònia ubicada a la Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya, únic punt de cria d'esta espècie (*Phoenicopterus roseus*) a Catalunya. L'anellament científic, efectuat a cries de flamenc nascudes la passada primavera forma part del projecte integrat dins la xarxa internacional Greater Flamingo Network d'estudi d'esta espècie en l'àmbit de tota la Mediterrània, on s'integren i analitzen tots els anellaments i lectures d'anelles.

El parc natural va integrar-se a esta xarxa el 2004, any en què es va

efectuar el primer anellament científic. Des d'aleshores s'han anellat prop de cinc mil polls de flamenc, dels quals s'han obtingut més de 27.000 observacions des de l'estuari del Sena fins a Senegal, i des de Portugal fins a Israel.

Per als ornitòlegs, l'anellament representa un instrument molt important per a obtenir dades de l'espècie i plantejar actuacions de conservació a escala global. En el cas del delta de l'Ebre, a més, representa un potent instrument de sensibilització social sobre la importància d'esta espècie.

Segons dades facilitades pel Parc Natural, enguany s'han reproduït 3.027 parelles de flamencs al delta de l'Ebre i s'han comptabilitzat un total de 1.830 polls, cosa que repre-

senta un èxit reproductor de 0,60 polls per parella, una xifra una mica per sobre de la mitjana de productivitat d'esta espècie en els anys que ha nidificat, que és de 0,52 polls per parella.

La població reproductora de flamenc d'enguany s'ha situat també per sobre de la mitjana des que esta es va establir a les salines de la Trinitat l'any 1992. A partir de l'any 2006, se va iniciar una tendència a l'alça en la reproducció d'esta espècie, amb un màxim històric de

El 1993 va ser el primer any en què el flamenc va aconseguir reproduir-se al Delta

4.303 parelles l'any 2020, segons dades facilitades pel Parc. No obstant això, durant el període 2013-2016, va començar un període advers de quatre anys (amb valors inferiors a les 1.000 parelles) relacionat amb problemes amb el gavià argentat de potes grogues *Larus michahelli* i la rabosa *Vulpes vulpes*.

Malgrat alguns intents a les dècades dels setanta i vuitanta, no és fins a l'any 1993 que el flamenc aconseguí reproduir-se a les salines de la Trinitat. Fins al moment, ha tingut èxit en 29 ocasions, inclosa la d'enguany.

L'anellament de polls és una operació complexa perquè mobilitza uns dos centenars de voluntaris, que es van aplegar en esta ocasió la matinada de diumenge passat a

les salines de la Trinitat. Al moment de començar a clarejar el dia els voluntaris, amb llargues canyes a les mans, formen una cadena humana per a encerclar totes les cries de flamenc de la colònia de la Punta de la Banya i conduir-les a un gran corral que es construí prèviament per a l'ocasió. Un cop tots els polls se troben dins, s'inicia el procés d'anellament. Primer se col·loca a cada poll dos anelles: una de metàl·lica i una altra blanca de PVC molt vistosa amb un codi alfanumèric que permet identificar l'exemplar a distància. Després se procedix a mesurar l'ala, el bec i el seu pes. Una vegada superat este procés, un voluntari és l'encarregat d'agafar l'animal i alliberar-lo. A primera hora del matí, tot el procés ja s'havia acabat. ■