

Cremes controlades al Delta per diversificar les zones naturals

La destrucció de senillar permet crear diversitat d'hàbitats en els que les aus faran el niu i es reproduiran a la primavera


M. MILLAN

Diversos espais naturals del Delta de l'Ebre són objecte aquest mes de febrer de cremes controlades. Efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i els Agents Rurals duen a terme els treballs, pensats per facilitar la diversitat d'hàbitats per a les aus, sota la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis i el Parc Natural del Delta de l'Ebre.

L'objectiu és reduir la vegetació, en especial els senillers que hi ha prop de les llacunes, per facilitar la renovació dels hàbitats i també el procés de nidificació de les aus, a partir del mes de març. Enguany les cremes s'han hagut de suspendre en moments puntuals pels recents temporals de vent.

Ahir els tècnics van dur a terme cremes controlades prop de la Llacuna de l'Encanyissada, a la zona de la Casa de Fusta. En els propers dies es faran també actuacions a la zona del Garxal i també en àrees noves, com ara prop dels Ullals de Baltasar. En aquest cas l'objectiu és eliminar espècies forànies com la canya americana, molt present en aquesta àrea, i crear zones de protecció per evitar incendis importants, segons explica al Diari José Ángel Terés, enginyer de forest del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals.

En aquesta època de l'any la vegetació reuneix les condicions òptimes per a realitzar aquesta



Dos tècnics, durant les cremes controlades fetes ahir a la zona de l'Encanyissada. FOTO: JOAN REVILLAS

operació i no afecta el període reproductiu de les aus, segons destaca el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor. El Departament d'Agricultura realitza aquestes cremes «conscient que són una eina de gestió que s'ha d'utilitzar amb precaució, a fi de no produir danys sobre tercers o a la mateixa vegetació o fauna», comenten.

Les cremes es van duent a terme en els espais naturals designats de forma fraccionada al llarg de quatre o cinc anys. D'aquesta manera, es facilita l'existència al mateix temps de zones de senillar espès i d'altres de lliures; una diversitat d'hàbitats que afavoreix l'establiment de les aus i el seu procés de nidificació. Entre les aus que trien aquests espais per fer el niu hi ha les de la família dels ardeïds, els ràllids (polles i rasclons) o els sílvids (boscarles, mosqueters, tallarols...), entre altres.