

La plaga del morrut afecta més de 300 palmeres de 21 pobles ebrenecs

Tortosa és actualment el municipi amb més incidència d'aquest insecte, seguit per Amposta i Alcanar

M. MILLAN

L'escarabat morrut, petit insecte que s'alimenta de l'ull de les palmeres fins a matar-les, s'ha convertit en tot un mal de cap per a tècnics, Generalitat i ajuntaments i particulars de les Terres de l'Ebre. La plaga s'ha estès amb rapidesa i ja ha afectat un total de 338 palmeres de 21 poblacions del Baix Ebre i el Montsià.

Al Baix Ebre, el municipi més afectat és Tortosa (on també s'ha estès la plaga per Vinallop, Bitem, Jesús i els Reguers), però també hi ha palmeres atacades a l'Aldea, Aldover, Benifallet, Deltebre, el Perelló, Roquetes, Tivenys i Xerta.

Pel que fa al Montsià, els municipis on hi ha una major incidència de la plaga són Amposta i Alcanar, però també és present a la Galera, Masdenverge, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Ulldecona.

L'escarabat morrut s'ha estès en els darrers anys per tot l'arc mediterrani de l'Estat i resulta molt difícil d'eradicar.

L'any 2005 el Departament d'Agricultura de la Generalitat va iniciar una sèrie de protocols



Palmera morta després de l'acció del morrut, a Amposta. FOTO: JOAN REVILLAS

d'actuació per tal d'intentar aturar l'avanç d'aquest escarabat, que ataca sobretot a la palmera canària, tot i que també pot afectar la palmera datilera.

Entre les mesures preses, hi ha la prohibició a 11 dels 74 vivers de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de comercialitzar espècies sensibles al morrut durant dos anys perquè s'han detectat exemplars infectats en aquestes empreses.

Al conjunt de Catalunya, la plaga ha colonitzat ja totes les co-

marques del litoral i es compten més de 8.400 palmeres afectades.

La Generalitat insisteix a la necessitat de comunicar tota detecció de focus de la plaga i de conscienciar de les possibilitats de salvar els exemplars afectats amb l'aplicació de fitosanitaris. Per aquest motiu, s'ha impulsat una campanya de sensibilització per a ajuntaments i particulars sobre la importància de lluitar contra aquesta plaga.

També s'han establert protocols d'actuació. Les palmeres afec-

tades que es puguin salvar cal que siguin immediatament sanejades mitjançant dendrocirurgia. Aquesta tècnica consisteix en eliminar les parts afectades fins a arribar a les parts sanes.

Un cop sanejades, cal fer immediatament un tractament fitosanitari. Les palmeres que no es vulgui o no es puguin salvar han de ser eliminades i destruïdes al més aviat possible, mitjançant la trituració amb màquines especialitzades. Les restes s'han de disposar en els punts establerts.

TORTOSA

'És molt difícil de combatre-la'

■ A Tortosa, on només en l'espai públic hi ha censades 350 palmeres (156 de les quals al Parc Teodor González), es realitzen tractaments preventius contra la plaga des de fa dos anys. Malgrat aquest treball, ja hi ha hagut afectacions en palmeres situades als Reials Col·legis, el passeig de Ronda o el mateix parc municipal.

Amb tot, les majors afectacions s'han produït en particulars, en finques de la Simpatíca, Sant Josep de la Muntanya, Vinallop o el Canalet de Jesús, segons detalla al Diari el regidor de Serveis de l'Ajuntament de Tortosa, Domingo Tomàs.

Un problema important és que resulta difícil percebre l'afectació en una palmera i sovint quan es fa visible, ja s'arriba tard. «Fem tractaments preventius i també per a intentar aturar el morrut quan ja ha afectat una palmera, però la majoria acaben morint igualment», explica Tomàs, que reconeix les grans dificultats que hi ha per combatre la plaga.

«Durant l'hivern s'atura però ara, amb l'arribada del bon temps, tornarà a la càrrega», comenta el regidor, per a qui els efectes es podran veure clarament a partir del mes de juny.

Insecte del sud-est asiàtic i l'Orient Mitjà que s'ha estès per tota la Mediterrània

■ Originari del sud-est asiàtic i de l'Orient Mitjà, el morrut roig (*Rhynchophorus ferrugineus*) s'ha acabat escampant arreu de la Mediterrània arran la comercialització de palmeres. A la península, el primer focus es va detectar a Andalusia el 1995 i, a Catalunya, el desembre del 2005 al Vendrell i Calafell, al Baix Penedès.

En el dia d'avui ja ha colonitzat pràcticament tot el litoral català provocant la mort de centenars de palmeres. Amb una mi-

da d'entre dos i quatre centímetres i mig, els escarabats morruts tenen una tonalitat vermellosa, unes taques molt característiques i el morro allargat.

Es desplacen volant o trepant per les palmeres fins a arribar al seu ull, on s'instal·len. Alguns dels símptomes evidents de la presència de la plaga en una palmera són la presència d'asimetries, l'abattiment d'una o de diverses fulles, l'aparició de clarianes anòmales, o una floració irregular.

Una de les principals mesures de prevenció és la protecció de les ferides generades en les palmeres perquè les feromones que desprenen són un focus d'atracció per als insectes. A més, la poda s'ha restringit als mesos d'hivern perquè és el període que els escarabats presenten una mobilitat menor. En cas de detectar la presència del morrut en una o més palmeres, Agricultura recomana l'aplicació immediata d'un tractament de xoc.



Detall d'un escarabat morrut roig que afecta les palmeres, especialment les canàries. FOTO: DEPARTAMENT D'AGRICULTURA