




El riu Ebre, al seu pas per l'assut de Xerta. FOTO: JOAN REVILLAS/DT

**MEDI AMBIENT** ■ L'OBJECTIU ÉS DIAGNOSTICAR RISCOS POTENCIALS

## La CHE finalitza un estudi pioner de substàncies contaminants en aqüífers

L'organisme regulador de la conca també ha publicat les noves normes per navegar als pantans on hi ha espècies invasores

**M. M. / AGÈNCIES**

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha finalitzat un estudi sobre contaminants en aigües subterrànies de la conca.

Es tracta del primer estudi realitzat a Espanya dedicat al càlcul de les concentracions de les principals substàncies contaminants en aqüífers de conques intercomunitàries, la presència de les quals suposen un deteriorament de la qualitat del recurs i un risc per a la salut de les persones.

En concret, s'han calculat concentracions de 52 substàncies contaminants (metalls, pesticides i hidrocarburs) en «valors genèrics de no risc» (VGNR) i els «valors genèrics d'intervenció» (VGI).

Els primers estableixen les concentracions que no és previsible que generin riscos per a receptors i usuaris de les aigües subterrànies.

Els «valors genèrics d'intervenció» defineixen els llindars a partir dels quals és necessari realitzar treballs de restauració del mitjà, fins a arribar al nivell de no risc.

Aquests valors permeten fixar objectius en les descontaminacions d'aqüífers i suposen un avanç en el control de l'estat de les masses d'aigua de la conca de l'Ebre, ja que la legislació europea no disposa de Normes de Quali-

tat Ambiental aplicables a les aigües subterrànies per a la majoria dels contaminants, explica la Confederació.

### Espècies invasores

Per altra banda, el Ministeri de Medi Ambient i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també han publicat al *Butlletí Oficial de l'Estat* la modificació de les normes de navegació en els embassaments de la conca, que restringeix les condicions per solcar les aigües en les zones afectades per espècies invasores tals com el musclo zebra o el caragol poma.

La Confederació ha aprovat una nova tipologia de classificació dels embassaments que són navegables en aquesta conca, de manera que elimina els anteriors tipus 1, 2 i 3 i les noves opcions són el Tipus C i el Tipus P. En concret, Tipus C seran tots els embassaments amb presència comprovada de musclo zebra, caragol poma o una altra espècie

exòtica que requereixi aquesta classificació.

En aquests punts, les administracions competents hauran d'habilitar punts fixos amb estacions de desinfecció de les naus i que aquestes prestin servei «a tots els usuaris en horaris compatibles amb la navegació,

### L'estudi ha calculat concentracions de 52 substàncies contaminants en aigües subterrànies

proporcionant als usuaris tiquets acreditatius d'aquesta desinfecció per permetre posteriors controls dels agents de l'autoritat». També desplegaran un sistema de vigilància per controlar un bon ús dels accessos a l'embassament.

### AMPOSTA

## Jornada de prospeccions de caragol poma al riu

■ La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), l'entitat conservacionista SEO/BirdLife i el sindicat agrari Unió de Pagesos han convocat una acció conjunta per combatre la plaga del caragol poma i el seu avanç al riu Ebre.

Aquest diumenge, 31 d'agost, duran a terme una jornada de prospeccions en piragua, aigües amunt d'Amposta, per tal de comprovar l'existència o no de caragols d'adults i postes d'aques-

ta espècie invasora. L'activitat arrencarà a les nou del matí i per participar-hi s'ha d'al·lugar una piragua, a un preu de 20 euros. Al migdia, les entitats compareixeran a Amposta per donar a conèixer els resultats d'aquesta prospecció.

El riu Ebre és un dels focus d'expansió de la plaga del caragol poma, que actualment afecta el marge esquerre del delta de l'Ebre i malmet el conreu de l'arròs.