

Estudi sobre l'ictus a les àrees de salut de l'Ebre

■ El 75 % dels ictus afecten persones més grans de 65 anys, un 41,5% dels casos deixen seqüeles de dependència moderada en els pacients i un 16% moren abans d'un any, segons un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol. Els pacients analitzats, amb una mitjana d'edat de 73 anys, són tots de vuit àrees bàsiques de salut de les Terres de l'Ebre.

L'estudi ha analitzat la mortalitat, grau de dependència, supervivència i anys potencials de vida perduts després d'un ictus, després de fer un seguiment a 553 persones que van patir un primer episodi d'ictus entre l'abril del 2006 i el maig del 2008.

En la fase inicial, l'IDIAP va fer un estudi retrospectiu des d'un any abans de patir l'episodi fins a finalitzar la primera fase de seguiment el 31 de març del 2010 i encara avui fan el seguiment prospectiu i s'ha ampliat amb els nous episodis d'ictus que han patit els participants.

L'estudi recull tant les variables clíniques com la discapacitat residual i l'estat vital dels pacients, mitjançant un registre centralitzat de defuncions i a partir de la informació existent als centres que intervenen en el procés d'atenció als pacients amb ictus.

Les conclusions de l'estudi indiquen que entre els 75 i els 84 anys es concentra la freqüència més elevada de patir un ictus.