

EL MORRUT DE LES PALMERES En només un any, la plaga s'ha estès, imparable, pel Baix Ebre i el Montsià i se n'han detectat casos a la Ribera d'Ebre

L'efecte de l'escarabat morrut sobre la població de palmeres de les Terres de l'Ebre ha sigut devastador en el darrer any. A les poblacions on ja s'havia detectat, l'escarabat ha avançat de forma imparable i ha

provocat la mort de moltíssimes palmeres (no hi ha cap recompte oficial). A finals del 2014, la plaga va arribar ja a quatre poblacions de la Ribera d'Ebre. La dificultat de fer arribar les campanyes de prevenció i

els protocols d'actuació als propietaris particulars, així com el cost i la dificultat dels tractaments fan "impossible" eradicar la plaga, segons els experts, i en facilita també la seua ràpida propagació.

El morrut roig de les palmeres s'escampa per l'Ebre i causa un efecte devastador

TERRES EBRE L.B.

Tot i que no hi ha dades oficials del nombre de palmeres afectades pel morrut, la magnitud de la tragèdia es fa evident només fent una passejada per qualsevol de les poblacions incloses al mapa d'afectació del morrut de les palmeres (vegeu la imatge). En un any, l'avanç de la plaga ha sigut imparable i el departament d'Agricultura ha deixat fins i tot de comptabilitzar el nombre de palmeres afectades. "Les Terres de l'Ebre han sigut la darrera zona de la Mediterrània on s'ha detectat", explica Gemma Galimany, cap de secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l'Ebre, "i un cop s'ha instal·lat és molt difícil d'eradicar", insisteix. A les Terres de l'Ebre es va detectar per primera vegada el no-

La plaga s'ha estès a la Ribera d'Ebre, amb palmeres infectades a Ginestar, Benissanet, Móra d'Ebre i Garcia

vembre del 2011 al municipi de Tortosa. Des de llavors, la plaga s'ha estès ràpidament, tot i que ha sigut durant el 2014 que l'efecte ha estat més devastador. A la zona on la plaga ja era present, a la majoria de municipis del Baix Ebre i el Montsià, hi



A l'esquerra, mapa d'afectació del morrut roig. A la dreta, palmeres afectades entre Roquetes i Jesús, a la via verda. / DAR / L'EBRE

ha hagut una mortalitat de palmeres molt alta durant els mesos de calor, que és quan el morrut ataca amb més força. A més a més, la plaga s'ha estès a la Ribera d'Ebre i a finals d'octubre del 2014 es van detectar les primeres palmeres infectades a les poblacions de Ginestar, Benissanet, Móra d'Ebre i Garcia. "Hem establert un perímetre de control de 10 quilòmetres al voltant d'aquests nous focus i hem hagut d'ampliar el mapa d'afectació", explica Galimany.

De moment, el morrut no ha arribat a la Terra Alta, tot i que alguns municipis estan inclosos dins el perímetre de control de 10 quilòmetres establert pel protocol.

Quan Sanitat Vegetal detecta nous focus de palmeres infectades pel morrut es du a terme una tasca important de difusió i assessorament sobre les mesures preventives que cal prendre per evitar més afectacions, així com el protocol d'actuació davant una palmera infectada. I

és que una de les principals preocupacions és que, "un cop la plaga s'ha instal·lat en una zona, és molt difícil aturar-la". Així, a principis de març hi ha programades diferents conferències informatives a Móra d'Ebre.

Malgrat l'esforç de difusió que fa Sanitat Vegetal, amb informació i assessorament a ajuntaments, entitats i professionals (jardiners i viveristes), Galimany reconeix que "costa molt arribar als propietaris particulars"

i, de fet, es pot constatar que moltes de les palmeres afectades són arbres aïllats dins de propietats privades. La manca d'aplicació de mesures preventives i el fet que no es faci una correcta retirada i destrucció de la planta estarien entre els principals motius que fan que la plaga siga pràcticament "impossible" d'eradicar i en facilita la propagació.

Continua a la pàg. 4

