



Treballs de crema controlada, ahir al matí, als Ullals de Baltasar. FOTO: JOAN REVILLAS

AMPOSTA ■ DINS EL PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE

Realitzen cremes controlades en dues hectàrees dels Ullals de Baltasar

Es tracta de focs provocats que ajuden a eliminar matèria orgànica i espècies al·lòctones d'aquest espai natural

REDACCIÓ

La Generalitat va dur a terme ahir una crema controlada als Ullals de Baltasar, al Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'objectiu de l'actuació era reduir l'acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits, que pot comprometre el moviment de la fauna que hi habita. Les cremes, que es desenvolupen anualment el mes de febrer, són una eina de gestió clau per regenerar ecosistemes humits.

Les feines van anar a càrrec del personal del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPiF) i del Cos d'Agents Rurals, amb la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i els tècnics del Parc Natural. Aquestes tasques ajudaran a controlar l'expansió de diferents arbres d'espècies exòtiques, com el caquier (gènere *Diospyros*), i del senill (*Phragmites australis*). El senill és una planta que, en condicions adequades, ocupa grans extensions i desplaça les altres espècies. La seva reproducció és bàsicament vegetativa, utilitzant els rizomes (arrels) per expandir-se, de forma que un nombre limitat d'individus poden ocupar una gran extensió de terreny.

Al Delta trobem senillars en molt bon estat al voltant de les basses, antics arrossars i marges

del riu. Aquests són hàbitats potencials per a la nidificació d'aus com les de la família de les ardeides, els ràllids (polles i rasclons) i altres espècies d'aus que hi viuen i hi nidifiquen com els sílvids (boscarles, mosqueters, tallarols, etc.). Arran de la seva elevada productivitat, any rere any, produeix una gran acumulació de matèria orgànica i restes de senill mort, que comporta una manca d'oxigen i un envelliment progressiu d'aquesta comunitat.

El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor. En aquesta època de l'any la vegetació reuneix les condicions òptimes per realitzar aquesta operació i no afecta el període reproductiu de les aus.

■ ■ ■

ebre@diariodeltarragona.com